

 CDT MEDICUS Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o. www.cdtmedicus.pl	FORMULARZ	F-7.5-29	Strona 1 / 1
	Oświadczenie świadomej zgody pacjenta na przeprowadzenie badania HISTEROSALPINGOGRAFIA.		norma 9001: 7.5 norma 14001: 4.4.6 norma 18001: 4.4.7 norma 27001: -----
Edycja: 1	Zmiana: A	Obowiązuje od: 10.12.2014	

.....
Pieczęć oddziału.

.....
Numer historii choroby.

1. Nazwisko i imię pacjenta

.....

2. Adres zamieszkania

.....

3. PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Histerosalpingografia (**HSG**) polega na uzyskaniu obrazu jamy macicy i jajowodów dzięki użyciu promieni rentgenowskich. Polega na wprowadzeniu przez drogi rodne kobiety środka kontrastującego, a następnie wykonaniu zdjęć rentgenowskich lub nagraniu filmu, dzięki którym uzyskuje się obraz jamy macicy i jajowodów.

Wskazania do badania:

- Diagnostyka niepłodności-kontrola drożności jajowodów
- Ocena skuteczności leczenia

Przygotowanie:

Dzień przed **HSG** należy zjeść lekkostrawną kolację, a w dniu badania lekkie śniadanie, a bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz moczowy. Ponieważ podczas histerosalpingografii wykorzystuje się promienie RTG, badanie wykonuje się tylko w pierwszej połowie cyklu menstruacyjnego, przed owulacją, ale po zakończeniu krwawienia. Gdyby badanie zostało wykonane w II połowie cyklu, czyli po owulacji, mogłoby pojawić się niebezpieczeństwo wykonania go we wczesnej ciąży.

Przebieg:

HSG wykonywane jest w pracowni rentgenowskiej i trwa około 10-15 minut. Pacjentka leży jak podczas zwykłego badania ginekologicznego, ma wprowadzony wziernik, który rozsuwając ściany pochwy uwidacznia szyjkę macicy, do której wprowadza się **jednorazowy** cewnik, przez który wstrzykuje się widoczny podczas prześwietlenia kontrast. Zazwyczaj wykonywane są jedno- dwa zdjęcia. Swobodne przedostanie się kontrastu do jamy brzusznej świadczy o drożności jajowodów, a wszelkie zaburzenia jego przepływu mogą wskazywać na nieprawidłowości.

Możliwe powikłania po badaniu:

- Ból podbrzusza - często
- Plamienia - często
- Następne stany zapalne – bardzo rzadko (w CDT Medicus podaje się po HSG profilaktyczną dawkę antybiotyku)
- Alergia na środek kontrastujący – rzadko

Bez zastrzeżeń zgadzam się na przeprowadzenie badania HISTEROSALPINGOGRAFIA.

.....
Data, podpis pacjentki

.....
Data, podpis lekarza